



Podcast #67 responde:

Os servidores e colaboradores do CDTN já vacinados poderão voltar às atividades presenciais?

Confira a resposta para essa e mais respostas no podcast interno, em áudio. O conteúdo está disponível de forma oculta no canal do CDTN no Youtube. [Acesse aqui.](#)

Posso tomar a vacina se estiver com sintomas gripais (febre, coriza, tosse, garganta inflamada, etc?)


Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença.

É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade para se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais.

Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas.

Qual a orientação do CDTN sobre a vacinação?

Se você está contemplado(a) na faixa etária que permite a vacinação contra a Covid-19, busque a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine-se.



VACINADOS

A partir da consulta com 80 servidores de 64 a 74 anos de idade.
Dados de 05/05/2021.

80

1ª dose

6

2ª dose